

I/. TRỊ HOÃN TỤ M THỤT:

1/. Tụ máu hoãn hiếm máu trong 12 tháng:

- Người đi khám phẫu thuật
- Người mắc bệnh sốt rét
- Tiêm vắc xin phòng và điều trị bệnh dại
- Phẫu thuật mang thai và cho con bú
- Người đi khám truyền máu và số lượng máu đông có mức độ bất thường các chất phụ máu điều chỉnh máu.
- Người đi đến các vùng, quốc gia có mức độ bất thường có thể lây lan qua đường máu.

2/. Tụ máu hoãn hiếm máu trong 03 tháng:

- Người đi tiêm vắc xin phòng các bệnh tử vong không hiếm máu trong 03 tháng.

3/. Tụ máu hoãn hiếm máu trong 06 tháng:

- Người đi xâm lấn trên da, xỏ lỗ tai, châm cứu...

4/. Tụ máu hoãn hiếm máu trong 07 ngày:

- Người đi sử dụng thuốc Aspirin không hiếm máu trong 07 ngày.

5/. Người đi có vùng da đỏ đỏ nhợt nhạt máu tĩnh mạch bất thường, xây xát, nhiễm trùng tụ máu hoãn cho đến khi điều trị khỏi các tổn thương đó.

II/. TRỊ HOÃN CHO MÁU VĨNH VIỄN:

- Đi tiêm thuốc sử dụng ma túy
- Đã quan hệ tình dục với gái mại dâm, với người nghiện, với người cùng giới.

"BAN CHỈ ĐẠO VÀN ĐỀNG HIẾM MÁU TÌNH NGUYỄN TỰ NH BÌNH DƯƠNG"